РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ, Л/ГА	СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТКИ)
Соя, горох (кроме зеленого горошка)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,75-1,0	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 листа) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы 16 месяцев.) Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербицидам на основе имидазолинонов) на семена и масло		1	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севооборотам: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох- через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; свеклу сахарную и свеклу столовую, рапс (традиционные сорта и гибриды) – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	50(1)

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:

Хранить при температуре от минус 5°С до плюс 30°С.

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года со дня изготовления в оригинальной упаковке изготовителя.



Никос

Злаки под контролем

Селективный послевсходовый гербицид для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и доминирующих однолетних двудольных сорняков в посевах кукурузы

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ продолжительный контроль всего спектра однолетних и многолетних злаковых сорняков, в том числе таких как гумай и пырей
- ✓ великолепно сочетается с гербицидами-партнерами, многократно усиливая эффективность
- ✓ отсутствие фитотоксичности по отношению к культуре и гибкие сроки применения (от 3 до 6 листьев культуры)
- ✓ короткий период распада в почве

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:

40 г/л никосульфурона

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:

концентрат суспензии

УПАКОВКА:

5л

канистра

СПЕКТР АКТИВНОСТИ:

Чувствительные злаковые сорняки: гумай (из семян и корневищ), лисохвост, мятлик (виды), овсюг (виды), щетинник (виды), плевел (виды), просо волосовидное, просо куриное, пырей ползучий, росичка кроваво-красная, сыть (виды) и др.

Чувствительные двудольные сорняки: Амброзия (виды), горчица полевая, редька полевая, звездчатка средняя, дурман вонючий, марь белая, паслен черный, канатник Теофраста, портулак огородный, сурепка обыкновенная, горцы (виды), щирица (виды) и др.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Препарат обладает системным действием. Гербицидные свойства основаны на способности действующего вещества ингибировать образование фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ:

8-10 недель.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

В зависимости от погодных условий гербицид начинает оказывать воздействие на сорняки уже через 4-6 часов после обработки. Полное отмирание растений наступает через 3 недели после применения.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ:

Уничтожает однолетние и многолетние злаковые, а также некоторые виды однолетних двудольных (широколистных) сорняков.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:

Препарат не проявляет фитотоксичности в отношении кукурузы. Не реко-

Полгар

Проверенный рецепт эффективности

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков

мендуется применять Никос в тех случаях, когда проводилась обработка семян и/или посевов кукурузы фосфорорганическими инсектицидами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Диапазон температуры от 15°С до 30°С, при оптимальной влажности почвы и воздуха.
Наилучшие результаты достигаются при проведении обработки сорных растений в период их активного роста. На участках, сильно засоренных однолетними или многолетними злаковыми сорняками, рекомендуется применять максимальную норму расхода гербицида (строго до фазы кущения).
Максимальная эффективность достигается при обработке сорняков в фазу 2–6 листьев у однолетних широколистных, 3–5 листьев у злаковых сорняков и при высоте многолетних злаковых сорняков 10–20 см.

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ФАЗАМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ:

Опрыскивание проводится в фазе 3-6 листьев культуры.

ДОЖДЕСТОЙКОСТЬ:

Осадки, выпавшие через 4 часа после применения гербицида, не влияют на его эффективность.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Для расширения спектра действия и снижения норм расхода, рекомендуем применять препарат Никос в баковой смеси со следующими препаратами: Никос+Люгер, Никос+Герб-480, Никос+Дикамин-Д.
Важно!
Не рекомендуется применять гербицид в смеси с фосфорорганическими инсектицидами, а также проводить опрыскивание посевов в течение минимум 7 дней после обработки фосфорорганическими инсектицидами, из-за возможного угнетения культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ, Л/ГА	СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТКИ)
Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	1-1,5	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	60(1)

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:

Хранить при температуре от минус 5°С до плюс 35°С.

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года со дня изготовления в оригинальной упаковке изготовителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ контроль всех злаковых сорняков в посевах зерновых
- ✓ начинает действовать сразу после обработки
- ✓ широкий диапазон применения и низкие нормы расхода
- ✓ отсутствие ограничений для применения в севообороте: быстрая деградация в почве
- ✓ высочайшая селективность к культуре
- ✓ экономически выгоден

СПЕКТР АКТИВНОСТИ:

Эффективен против широкого спектра злаковых сорняков: овсюг, виды; просо, виды; канареечник, виды; куриное просо; лисохвост мышехвостниковидный; метлица обыкновенная; кукуруза, падалица; щетинник, виды.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Гербицид системного действия. Препарат поглощается наземными органами растения в течение 1–3 часов после применения. На биохимическом уровне гербицид ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран, что ведёт к прекращению роста и гибели сорных злаков.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ:

Участок освобождается от однолетних злаковых сорняков, попавших под обработку препаратом, на срок 4-5 недель.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Поглощается надземными органами (главным образом, через листья) в течение 1-3 часов после применения, передвигается по флоэме и ксилеме, накапливается в точках роста. Полная гибель сорняков наступает через 10-15 дней после обработки.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ:

Пшеница яровая и пшеница озимая проявляет достаточно высокую устойчивость к гербициду (в пределах рекомендованных норм применения), поэтому срок обработки препаратом определяется фазой роста сорняков.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:

100 г/л феноксапроп–П–этила

+

27 г/л мефенпир–диэтила (антидот)

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:

концентрат эмульсии

УПАКОВКА:

5л

канистра